

У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп 0 αβ (I) , Aβ (II), B α (III) . Досліджувана кров належить до групи:

0 αβ (I)

Aβ (II)

Bα (III)

AB (IV)

Немає вірної відповіді

Після проведення лікарем усіх досліджень, за виключенням проби на індивідуальну сумісність крові донора та реципієнта, переливання одногрупної та резус-сумісної крові реципієнту викликало різке погіршення його стану (виник біль у ділянці нирок, грудної клітки та ін.).

Гемотрансфузію було припинено. Що викликало подібний стан пацієнта?

Реакція однотипних антигенів та антитіл, відмінних від систем ABO та CDE

Помилка при виконанні проби на групову належність у системі ABO

Помилка при виконанні проби на групову належність у системі CDE

Помилка при виконанні біологічної проби

Реакція однотипних антигенів та антитіл систем ABO та CDE

Під час визначення групи крові системи ABO при допомозі цоліклонів (моноклональних антитіл) аглютинація еритроцитів не відбулась з жодним із цоліклонів. Яка група крові у цієї людини?

0 I

A II

B III

AB IV

Немає вірної відповіді

Дослідження групової належності крові за допомогою цоліклонів виявило реакцію аглютинації із цоліклоном анти-B і її відсутність із цоліклоном анти-A. Яка група крові в пацієнта?

III (B)

I (0)

II (A)

IV (AB)

III (B) або IV (AB)

При визначенні групової належності крові людини в системі ABO на мембранах еритроцитів виявили присутність аглютиногенів A. Які аглютиніни міститимуться у плазмі крові цієї людини?

Бета

Альфа

Альфа і бета

Аглютиніни відсутні

Немає вірної відповіді

У жінки під час пологів в зв'язку з крововтратою визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбудася зі стандартними сироватками груп $O\alpha\beta$ (I), $A\beta$ (II) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи $B\alpha$ (III). Досліджувана кров належить до групи

$B\alpha$ (III)

$O\alpha\beta$ (I)

$A\beta$ (II)

AB (IV)

Немає вірної відповіді

У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп $O\alpha\beta$ (I), $B\alpha$ (III) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи $A\beta$ (II). Досліджувана кров належить до групи:

$A\beta$ (II)

$O\alpha\beta$ (I)

$B\alpha$ (III)

AB (IV)

Немає вірної відповіді