

Під час огляду хворого при проведенні аускультації лікар оцінює роботу мітрального клапана. Де вислуховують тон цього клапану?

На верхівці серця

Укряя груднини справа напроти хряща 5 ребра

У края груднини в другому міжребер'ї справа

У края груднини в другому міжребер'ї зліва

У края груднини зліва напроти хряща 5 ребра

У обстежуваного в II міжребер'ї по парастернальній лінії справа при аускультації краще прослуховується II тон, ніж I. Закриттям якого клапану зумовлено формування II тону?

Півмісяцевий клапан аорти

Півмісяцевий клапан легеневого стовбура

Лівий двостулковий клапан

Правий трьохстулковий клапан

Двостулковий та трьохстулковий клапани

У хворого під час обстеження встановлено подовження I-го тону серця. Походження I-го тону серця пов'язано з:

Закриттям атріовентрикулярних клапанів

Відкриттям мітрального клапана

Відкриттям трьохстулкового клапана

Закриттям аортального клапана

Закриттям пульмонального клапана

У хворого під час обстеження встановлено подовження II-го тону серця. Походження II-го тону серця пов'язано з:

Закриттям півмісяцевих клапанів

Відкриттям півмісяцевих клапанів

Відкриттям мітрального клапана

Відкриттям трьохстулкового клапана

Закриттям атріовентрикулярних клапанів

Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка судина зазнала патологічних змін?

Аорта

Легеневий стовбур

Легенева вена

Верхня порожниста вена

Нижня порожниста вена