

У пацієнта діагностовано класичну гемофілію А. Дефіцит якого фактору є причиною цієї патології?

VIII.

IX.

XII.

V, X.

I, II.

Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб спричинити згортання?

Іони кальцію

Іони натрію

Протромбін

Вітамін К

Фібриноген

Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. Під час аналізу крові виявлено дефіцит II фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у пацієнта?

Утворення тромбіну

Судинно-тромбоцитарний гемостаз

Утворення фібрину

Фібриноліз

Ретракція згустку

Абсолютний дефіцит вітаміну К в організмі призводить до:

Гіпокоагуляції

Порушення адгезії тромбоцитів

Дисбактеріозу кишечника

Гіперкоагуляції

Порушення адгезії тромбоцитів

Під час чищення зубів іноді травматизується слизова порожнини рота.

Однак, кровотеча сама швидко вщухає внаслідок наявності в складі слини:

Прокоагулянтів

Ліполітичних ферментів

Амілолітичних ферментів

Мінеральних речовин

Лізоциму та муцину

Захворювання печінки зазвичай супроводжуються вираженою кровоточивістю. З чим це пов'язане?

Знижений синтез протромбіну і фібриногену

Знижений синтез жовчних кислот

Порушений пігментний обмін

Знижена концентрація кальцію в крові

Посилений розпад факторів згортання

У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:

Катехоламінів
Кортизолу
Альдостенору
Соматотропіну
Вазопресину