

У приймальне відділення доставлено хворого з гострою кровотечею. У разі втрати якого об'єму циркулюючої крові може настати летальний кінець у такого хворого?

- 33%
- 50%
- 12%
- 75%
- 3%

Після землетрусу людина перебувала під завалом без їжі та води 4 доби. У швидкій медичній допомозі постраждалому було введено 0,7 літра 0,85% розчину NaCl в/в. Яка мета подібної маніпуляції?

- Відновлення збільшеного значення осмотичного тиску плазми крові
- Відновлення зменшеного осмотичного тиску плазми крові
- Відновлення зменшеного рН плазми крові
- Відновлення збільшеного рН плазми крові
- Відновлення зменшеного онкотичного тиску плазми крові

В пробирку, що містить розчин NaCl 0,9%, додано краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?

- Зостануться без змін
- Осмотичний гемоліз
- Біологічний гемоліз
- Сморщивання
- Набухання

У хворого, що знаходиться на лікуванні в інфекційному відділенні з приводу дизентерії, знайшли значне підвищення гематокритного показника крові (60%). До зміни яких показників це приведе?

- Збільшення в'язкості крові
- Збільшення обсягу циркулюючої крові
- Лейкопенія
- Тромбоцитопенія
- Збільшення ШОЕ

В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з маточною кровотечею. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?

- Зменшення гематокритного числа
- Еозинофілія.
- Сповільнення ШОЕ
- Лейкоцитоз
- Збільшення кольорового показника

Аналіз крові жінки виявив підвищення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), що обумовлено:

- Вагітністю
- Фізичною працею
- Втратою крові
- Стресом

Прийомом їжі

Людина в спекотну погоду тривалий час була позбавлена можливості пиття, що спричинило виражене відчуття спраги. Зміна якого гомеостатичного показника крові стала першопричиною цього?

Осмотичний тиск плазми

pH

Гемактокрит

Рівень глюкози

Онкотичний тиск плазми