

Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об'єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. При цьому у хворої спостерігається випадіння поля зору в:

- Лівих половинах сітківки обох очей
- Правих половинах сітківки обох очей
- Правих і лівих половинах сітківки лівого ока
- Правих і лівих половинах сітківки правого ока
- Правих і лівих половинах сітківки обох очей

У чоловіка відмічається випадіння функції медіальних половин сітківки. Який відділ провідного шляху зорового аналізатора уражений?

- Зорове перехрестя
- Лівий зоровий тракт
- Правий зоровий тракт
- Лівий зоровий нерв
- Правий зоровий нерв

Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку може бути причиною цього?

- Потилична
- Скронева
- Лобна
- Тім'яна
- Скронева та тім'яна

При обстеженні хворого окуліст виявив збільшення часу адаптації ока до темряви. Нестача якого вітаміну може бути причиною такого симптому?

- A
- B6
- B2
- C
- K

При переведенні погляду на близько розташований об'єкт, заломна сила оптичних середовищ ока збільшилася на 10 діоптрій. Це є результатом зміни стану такої структури ока:

- Кришталік
- Рогівка
- Скловидне тіло
- Волога передньої камери ока
- М'яз, що розширює зіницю