

Встановлено, що аглютинація еритроцитів крові реципієнта викликали стандартні сироватки I та II груп і не викликали - сироватка III групи і антирезусна сироватка. Кров якої групи за системами АВ0 і резус можна переливати реципієнту?

B, α (III) Rh⁻

A, β (II) Rh⁻

O, α , β , (I) Rh⁺

AB (IV), Rh⁺

AB (IV), Rh⁻

Під час визначення групової належності крові за системою АВ0, аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп, та не викликала сироватка III групи. Кров якої групи досліджується?

B (III) α

A (II) β

AB (IV)

O (I) α та β

Неможливо визначити

При визначенні групи крові за системою АВ0 за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинацію еритроцитів викликали сироватки I, II та III груп. Яка група досліджуваної крові?

AB(IV)

B(III)

A(II)

O(I)

Неможливо визначити

При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I і II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові?

B(III) альфа

A(II) бета

A B(IV)

O (I) альфа, бета

Неможливо визначити

При лабораторном исследовании крови пациента 33-х лет установлена реакция агглютинации эритроцитов в стандартных сыворотках I и II групп. Реакция агглютинации с сывороткой III группы и антирезусной сывороткой не состоялась. Кровь какой группы, учитывая систему резус фактора, можно переливать в случае необходимости?

III()Rh⁻

II()Rh⁻

I(O)Rh⁺

IV()Rh⁺

IV()Rh⁻

У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп $0\alpha\beta$ (I), $B\alpha$ (III) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи $A\beta$ (II). Досліджувана кров належить до групи:

- $A\beta$ (II)
- $0\alpha\beta$ (I)
- $B\alpha$ (III)
- AB (IV)

Неможливо визначити

У жінки з III (B), Rh⁻ групою крові народилась дитина з II (A) групою крові. У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові за системою AB0 та резус-належність можливі у батька?

- II (A), Rh⁺
- I (O), Rh⁺
- III (B), Rh⁺
- I (O), Rh⁻
- II (A), Rh⁻

У жінки під час пологів в зв'язку з крововтратою визначили групу крові, Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп O (I), A (II) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи B (III). Досліджувана кров належить до групи

- B (III)
- O(I)
- A (II)
- AB (IV)

Неможливо визначити

У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп $0\alpha\beta$ (I), $A\beta$ (II), $B\alpha$ (III). Досліджувана кров належить до групи:

- $0\alpha\beta$ (I)
- $A\beta$ (II)
- $B\alpha$ (III)
- AB (IV)

Немає правильної відповіді

У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп O (I), A (II), B (III). Досліджувана кров належить до групи:

- O(I)
- A (II)
- B (III)
- AB (IV)

Неможливо визначити

Під час визначення групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові?

В(III) альфа

A (II) бета

AB(IV)

0 (I) альфа, бета

Неможливо визначити

У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0αβ (I), Aβ (II), Bα (III). Досліджувана кров належить до групи:

0αβ (I)

Aβ (II)

Bα (III)

AB (IV)

—

При яких групах крові батьків зарезус-фактором можливий розвиток резус-конфлікту під час вагітності?

Жінка Rh(-), чоловік Rh(+) (гомозигота)

Жінка Rh(+), чоловік Rh(+) (гомозигота)

Жінка Rh(+), чоловік Rh(+) (гетерозигота)

Жінка Rh(-), чоловік Rh(-)

Жінка Rh(+) (гетерозигота), чоловік Rh(+) (гомозигота)

Під час визначення групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові?

В(III) альфа

A (II) бета

A B(IV)

0 (I) альфа, бета

Неможливо визначити

У жінки під час пологів в зв'язку з крововтратою визначили групу кров за системою АВ0. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (I), A (II) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи B (III). Досліджувана кров належить до групи:

B (III)

Немає правильної відповіді

0 (I)

A (II)

AB (IV)