

В медичній практиці застосовують антикоагулянти, що посилюють дію інгібіторів факторів коагуляції антитромбіну III. Такий ефект притаманний:

- Гепарину
- Колагену
- Гіалуронової кислоти
- Кератан-сульфату
- Дерматан-сульфату

В якості антикоагулянтів використовують різноманітні речовини, в тому числі полісахарид природного походження, а саме:

- Гепарин
- Гіалуронова кислота
- Хондроїтинсульфат
- Декстран
- Дерматансульфат

При травмі людина втратила 500 мл крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив якого гормону на нирки забезпечив, перш за все, цю пристосувальну реакцію?

- Вазопресин
- Натрійуретичні фактори
- Альдостерон
- Кортизол
- Ренін

У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:

- Катехоламінів
- Кортизолу
- Альдостенору
- Соматотропіну
- Вазопресину

У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові

- Адреналіну
- Тироксину
- Соматотропіну
- Кортизолу
- Плазмінів