

Заняття 62 (34).КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕЧІ. ДОСЛІДЖЕННЯ УЧАСТІ НИРОК У ПІДТРИМЦІ ГОМЕОСТАЗУ

3 роки тому хворій 34 років було встановлено діагноз хронічного гломерулонефриту. За останні 6 місяців з'явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку?

- Протеїнурія
- Гіперпродукція вазопресину
- Порушення білковоутворюючої функції печінки
- Гіперосмолярність плазми
- Гіперальдостеронізм

З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього?

- Білків
- Жирів
- Вуглеводів
- Вітамінів
- Мінеральних речовин

У водія, який потрапив у ДТП, отримав травму та знаходиться у стані шоку, спостерігається зменшення добової кількості сечі до 300 мл. Який основний патогенетичний фактор цієї зміни діурезу?

- Падіння артеріального тиску
- Зниження онкотичного тиску крові
- Підвищення проникності судин
- Зменшення кількості функціонуючих клубочків
- Вторинний гіперальдостеронізм

У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищення тиску?

- Ренін
- Адреналін
- Норадреналін
- Еритропоетин
- Вазопресин

У фізично здорових молодих курсантів після важкого фізичного навантаження при одноденному пішому переході на 50 км в сечі виявлено білок, рівень якого в середньому не перевищував 1 г/л. Який різновид протеїнурії мав місце?

- Маршова
- Дегідратаційна

Аліментарна
Органічна
Несправжня

Чоловік 32-х років чотири роки страждає на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Відзначаються явні набряки на обличчі, в останній час з'явилися набряки на ногах та тулубі. Який із механізмів розвитку набряків найбільш вірогідний у цього хворого?

- Зниження онкотичного тиску крові
- Підвищення гідростатичного тиску крові в капілярах
- Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини
- Утруднення лімфовідтоку
- Підвищення проникливості капілярів