

У хворого зареєстрували ЕКГ. За яким її елементом лікар може оцінити процеси розповсюдження деполяризації передсердями?

Зубець Р

Зубець R

Зубець Q

Зубець T

Зубець S

У хворого зареєстрували ЕКГ. За яким її елементом лікар може оцінити процеси розповсюдження деполяризації передсердями?

Зубець Р

Зубець R

Зубець Q

Зубець T

Зубець S

У хворого 30 років на електрокардіограмі відмічено зниження амплітуди зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?

Поширення збудження по шлуночкам

Поширення збудження від передсердь до шлуночків

Електричну діастолу серця.

Реполіризацію шлуночків

Поширення збудження по передсердям

Аналіз ЕКГ хворого виявив відсутність зубця Р. Тривалість та амплітуда QRS комплексу та зубця Т відповідають нормі. Що є водієм ритму серця даного пацієнта?

Передсердно-шлуночковий вузол

Синусовий вузол

Пучок Гіса

Волокна Пуркін'є

Міокард шлуночків

Під час аналізу електрокардіограми встановлено збільшення тривалості і амплітуди зубця S. Деполяризація якої ділянки серця порушена у хворого?

Базальні відділи шлуночків

Передсердя

Верхівка серця

Бокові стінки шлуночків

Середня і нижня третина міжшлуночкової перегородки

При аналізі ЕКГ людини з'ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість відповідає нормі. Вірним є висновок про те, що в шлуночках серця нормально відбувається процес:

Реполіризація

Деполяризація

Збудження

Скорочення
Розслаблення